

## **Recommandation de lutte contre le varroa à mettre en œuvre à la même période par tous les apiculteurs**

- Evaluer en continu le degré d'infestation par les varroas :
  - o En juin : comptage des varroas qui tombent naturellement sur une feuille blanche pendant 3 jours
  - o En septembre : comptage des varroas phorétiques sur 300 abeilles par la méthode du sucre impalpable
- Traiter en même temps toutes les colonies d'un même rucher
- Préférence aux méthodes de lutte physique :
  - o Dès qu'on enregistre, en début de saison, la chute naturelle de plus d'un varroa sur 3 jours, on procède à l'élimination du couvain mâle 21 jours après son apparition (répéter l'opération s'il réapparaît)
  - o On procède à l'isolement de la reine (cage à reine du 21 juin au 15 juillet), au blocage de ponte et au retrait du couvain operculé. Hors miellée, cela peut être couplé au traitement chimique des abeilles adultes.
  - o En été on procédera au retrait du couvain operculé infesté avant la production d'abeilles d'hiver (du 01 juillet au 15 août). Hors miellée, cela peut être couplé au traitement chimique des abeilles adultes.
- Lutte chimique : à éviter pendant la miellée et couplée aux méthodes physiques.

La délivrance des médicaments est règlementée. Demandez l'avis de votre vétérinaire.

<b>Printemps</b> Avant la miellée  Si chute >1 acarien/ jour  En absence de couvain operculé	VarroMed	Verser entre les cadres du couvain (répéter à 6 jours d'intervalle le traitement si chute > 10 acarions/jour)	Ac. Oxalique 44mg/Ac. Formique 5 mg
	Oxuvar	1 seul traitement (T° extérieure > 5°C)	Ac. Oxalique
<b>Pendant la miellée</b>	Voir lutte physique		
<b>Eté</b> Après la récolte du miel  idem  idem  En absence de couvain operculé	Apilife Var	Répéter le traitement si chute > 1 acarien par jour (T° extérieure > 15°C)	Thymol 8,00 g + Camphre 0,3 g
	Thymovar	Remplacer une seule fois les plaquettes après 3-4 semaines (T° extérieure > 15°C)	Thymol 15,00 g
	Polyvar Yellow	En période de vol pendant 9 semaines à l'entrée de la ruche	Fluméthrine 275 mg
	Oxuvar	1 seul traitement	Ac. Oxalique

<b>Fin été/Automne</b> Après la dernière miellée	Apivar VaroMed	/ 3 Traitements à 6 jours d'intervalle (si chute > 4 acariens par jour) Ce traitement peut être répété 2 fois en cas de forte infestation (>150 acariens)	Amitraz 500 mg Ac. Oxalique 44mg/Ac. Formique 5 mg
<b>Hiver</b> En absence de couvain	VarroMed  OxyBee  Oxuvar	1 seul traitement  1 seul traitement (T° extérieure > 3°C) 1 seul traitement (T° extérieure > 5°C)	Ac. Oxalique 44mg/Ac. Formique 5 mg Ac. Oxalique  Ac. Oxalique

Les recommandations complètes sont disponibles sur le site web <http://www.favv-afsc.fgov.be/apiculture/santeanimale/#varroase>